

網膜静脈閉塞症

- ▶ 網膜の静脈が詰まってそこから出血する病気です。
- ▶ 高血圧や動脈硬化により硬くなった網膜の動脈が静脈を圧迫することで、静脈に血栓ができて詰まることで発症します。
- ▶ 詰まる場所によっておもに下記の2つのタイプに分類されます。

症状

自覚症状がない場合もあります。眼底出血や網膜のむくみ(浮腫)を伴う場合には、ものがゆがんで見える「変視症」や急激にものが見えなくなる「急激な視力低下」をきたすことがあります。




変視症



視力低下


● 網膜静脈分枝閉塞症 (BRVO)* *BRVO : branch retinal vein occlusion

網膜内の静脈が詰まり発症します。




● 網膜中心静脈閉塞症 (CRVO)** ** CRVO : central retinal vein occlusion

視神経内の静脈が詰まり発症します。




FA : フルオレセイン蛍光眼底造影 OCT : 光干渉断層計

- ▶ 黄斑浮腫により視力低下が起こるため、黄斑浮腫の治療をおこないます。
- ▶ 抗 VEGF *薬、ステロイド薬、レーザー光凝固術、硝子体手術などの治療法があります。



網膜の静脈が一部詰まって、その周辺に出血、軟性白斑がみられます。OCTでは、黄斑浮腫を認めます。



抗 VEGF 薬の注射により、黄斑浮腫は改善しています。

OCT : 光干渉断層計